

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, 12915 N

W.6

4 maart 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Sluitkoolachtigen	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Boerenkool	Na uitplanten/ na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per teeltcyclus	2 kg/ha per teeltcyclus	-	42
			1 kg/ha	2 per teeltcyclus		7	
Zaaiui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56

Eerstejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Tweedejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Sjalotten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Asperge (onbedekte teelt)	Voor het steken of onderblad-behandeling na het steken	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
	Na het steken, onderblad bespuiting		1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Prei	Na planten/ na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	28
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	

* maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 2 keer met 0,5 kg/ha of maximaal 3 keer toepassen met 0,5 kg/ha

Het gebruik in de onbedekte teelt van lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien, knoflook, asperge (zaaibed, eerstejaars aanplant), zaaiprei, suikermais, maggiplant, valeriaan, gladiool, bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
--------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--	--	---	------------------------------

Lupine (Peulvrucht)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Blauwmaanzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Koolzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Klaver (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Luzerne (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Koolrabi	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,65 kg/ha	1	1,65kg/ha per 12 maanden	-	42
Schorseneer	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	7	56
Zilverui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha +0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Picklers	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Bosuien (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Knoflook	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Asperge	Na opkomst	Eenjarige	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12	7	-

(zaaibed, eerstejaars aanplant, onbedekte teelt)		breedbladige onkruiden			maanden		
Zaaiprei	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Suikermaïs	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per teeltcyclus	-	-
			1 kg/ha	2		7	
Maggiplant (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12 maanden	7	-
Valeriaan (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	14	56
Gladiool (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Onderbladbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
Coniferen (onbedekte teelt)	Onder het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	Onderbladbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-

** maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0,5 kg/ha

Toepassingsvoorwaarden

Draag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming met een minimale beschermingsfactor van 10 bij toepassingen met een handspuit.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen is toepassing in de periode van 1 september tot 1 maart niet toegestaan.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, asperge (zaaibed, eerstejaars aanplant), zaaiprei, suikermais, maggiplant, valerian, gladiool, bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in ui en ui-achtigen uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen en een kantdop.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in schorseneren uitsluitend toegestaan tot BBCH 40, het begin van de wortelverdikking/groei

In koolgewassen kan er kort na toediening enige gewasschade ontstaan. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en leidt niet tot opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies.

Ter voorkoming van gewasschade dienen de onderstaande toepassingstijdstippen in acht te worden genomen:

- In ter plaatse gezaaide kool het middel toepassen na opkomst van het gewas vanaf het 4 tot 6 bladstadium van het gewas. In geplante kool het middel 2 tot 4 weken na het uitplanten toepassen als het gewas goed is aangeslagen en tenminste 4 bladeren heeft ontwikkeld.
- In uien toepassen na het vlagbladstadium in een LDS-systeem op een afgehard gewas. Vanaf het 2 bladstadium van het gewas bespuitingen uitvoeren.
- In prei toepassen na opkomst (vanaf het 2 tot 3 bladstadium) of na het uitplanten.
- In de productieteelt van asperges toepassen voor het steken of na het steken door middel van een onderbladbehandeling. In 1^e jaars aanplant en op zaaibedden van asperges toepassen vanaf het 2 tot 3 bladstadium van het gewas.